

Herstellungsvorschrift Steroid-Salbe 0,1%

Hinweis: Diese Herstellungsvorschrift ist von der Apotheke des Städtischen Klinikums Braunschweig erstellt und für die Patienten des Klinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die herstellende Apotheke nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (Plausibilitätsprüfung, Dokumentation, etc.).

Herstellung der Salbe:

Ausgangsstoffe	Sollmenge
Gramicidin	0,0125 g
Neomycinsulfat	0,25 g
Triamcinolonacetonid	0,05 g
Hydrophobes Basisgel	49,6875 g
Gesamtmenge	50,0 g

1. Die Wirkstoffe werden nacheinander gewogen und in eine mit Pistill tarierte Fantaschale überführt
Inprozessprüfung: Die Wägeunterlage wird rückgewogen, der angezeigte Wert darf nicht höher sein als 1.0% der Wirkstoffmasse.
2. Die Grundlage wird anteilig hinzugegeben und mit den Wirkstoffen verrieben.
Inprozessprüfung: Die Salbe muss homogen sein.

Haltbarkeit: 6 Monate im Kühlschrank

Quellen: eigene Untersuchungen

Zuletzt aktualisiert am 25.02.2019